

---

## Quels sont les effets secondaires ?

Vous ne ressentez rien pendant l'examen, étant sous anesthésie générale. Au réveil, vous pouvez ressentir, d'une part les effets secondaires de l'anesthésie (sommolence, nausées, fatigue), d'autre part les inconvénients de l'endoscopie (gêne dans la gorge ou dans la bouche et les lèvres, ballonnement, émissions de gaz, diarrhée).

Vous pouvez également ressentir une gêne allant même jusqu'à la douleur intense.

Il ne vous est pas permis de vous alimenter le jour de l'examen. L'alimentation est reprise le lendemain, sauf complication ou nécessité de réaliser d'autres examens.

---

## Quelles sont les complications possibles ?

Tout acte médical, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité optimales, peut entraîner d'éventuelles complications.

Ces dernières demeurent rares lors de la mise en place d'une prothèse, mais peuvent être plus fréquentes s'il y a des traitements associés comme une dilatation de sténose par exemple.

Les plus citées sont les perforations digestives, les hémorragies et les infections.

Ces complications peuvent également apparaître quelques jours après l'examen (douleur abdominale ou thoracique, frissons, fièvre, et sang noir ou rouge dans les selles). Il est alors indispensable de contacter votre médecin traitant ou de vous rendre aux urgences.

---

## Quelles sont les alternatives ?

Il n'existe pas beaucoup d'alternatives moins traumatiques. Le traitement chirurgical de dérivation comporte des risques plus élevés et nécessite une hospitalisation plus longue.

---

## Et en cas de refus du patient ?

Si la mise en place de la prothèse n'est pas réalisée, cela peut avoir des conséquences néfastes pour votre santé.

---

## Informations administratives

Le jour de l'examen, n'emportez aucun objet de valeur et/ou d'argent. Munissez-vous de votre carte d'identité nationale, de vos documents médicaux (résultats d'exams...), et de votre carte de groupe sanguin. Remettez au personnel infirmier le nom de votre médecin traitant ainsi que le nom et le numéro de téléphone d'une personne à contacter en cas de besoin.



---

# PROTHÈSE DU TUBE DIGESTIF - PROTHÈSE ŒSOPHAGIENNE

---

Service de **Gastroentérologie**



---

## Qu'est-ce que l'examen ?

Le placement d'une prothèse œsophagienne est parfois nécessaire pour assurer le traitement palliatif d'une dysphagie, dans le cas d'un cancer avancé. Une indication moins courante est la fistule œso-trachéale ou une sténose bénigne (peptique ou caustique).

Elle est mise par voie endoscopique lors d'une gastroscopie.

---

## Comment se préparer à l'examen ?

Vous devez être à jeun, cela induit que vous ne pourrez ni boire, ni manger, ni fumer pendant les 8 heures qui précèdent l'examen.

Les médecins du service où vous séjournerez et votre gastroentérologue sont à votre écoute pour toute question que vous vous posez. Il est très important de préciser les médicaments que vous prenez, spécialement ceux qui modifient le processus de coagulation ainsi que vos allergies.

C'est en étroite concertation entre votre gastroentérologue et votre cardiologue que certains médicaments pourront être suspendus.

Avant l'examen, il est indispensable d'enlever vos prothèses dentaires ainsi que vos lunettes.



---

## Comment réalise-t-on l'examen ?

### A. L'anesthésie

L'examen peut être inconfortable et nécessite un calmant intraveineux. En vue de cette anesthésie, il vous sera demandé de remplir un questionnaire préopératoire ou, au besoin, de prendre rendez-vous en consultation préopératoire.

### B. L'examen

La prothèse œsophagienne est placée lors d'une endoscopie haute, où un endoscope souple est glissé par la bouche jusqu'à l'endroit de la lésion.

La prothèse glisse sur un fil guide, puis est libérée de son système de contention. L'expansion de la prothèse est différente selon le type de prothèse. Il en existe de différentes tailles, formes, matières, etc. Parfois, pour éviter une compression trachéale lors de l'expansion de la prothèse œsophagienne, il est nécessaire de réaliser une broncho-fibroscopie et de mettre une prothèse dans les voies respiratoires.

La mise en place de la prothèse se fait sous contrôle endoscopique et radiologique.

### C. La durée de l'examen

La durée de l'examen est variable selon les difficultés techniques rencontrées. Ainsi, il faut compter au moins 30 minutes, sans rajouter le temps de l'installation dans la salle d'examen, le temps de l'anesthésie et du réveil.

L'examen a toujours lieu dans le cadre d'une hospitalisation, mais dans certains cas très rares cela peut se faire en hôpital de jour.



Centre Hospitalier de Wallonie picarde - CHwapi  
Association Sans But Lucratif

---

#### Site IMC

80, chaussée de Saint-Amand - 7500 Tournai

---

#### Site NOTRE-DAME

9, avenue Delmée - 7500 Tournai

---

#### Site UNION

51, rue des Sports - 7500 Tournai

---

#### Centre de Consultations de PÉRUWELZ

11, rue de Sondeville - 7600 Péruwelz



Numéro d'appel général unique  
pour tous les sites : 069/333 111

www.chwapi.be |  