

---

## Quelles sont les complications possibles ?

Tout acte médical, investigation, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et sécurité présente un risque de complication. Les complications de la gastrostomie sont peu fréquentes, le plus souvent mineures : elles peuvent être influencées par vos antécédents médico-chirurgicaux ou la prise de certains médicaments.

### 1. Complications immédiates liées à la technique de mise en place

- a. Perforation colique
- b. Les risques hémorragiques
- c. Les troubles cardiovasculaires ou respiratoires
- d. Les infections de plaies locales

### 2. Complications tardives liées à la sonde qui peut se boucher

Toutes ces complications apparaissent le plus souvent au moment du geste, mais peuvent également se révéler quelques jours après l'intervention (douleurs abdominales et du thorax, vomissements de sang rouge ou noir, selles noires, fièvre, frissons...). Il est alors très important de contacter immédiatement votre médecin.

---

## Quelles sont les alternatives ?

La sonde naso-gastrique mise par le nez provoque à long terme de l'inconfort, un risque d'arrachement et de blessures locales. D'une manière ou d'une autre, pour rendre possible l'alimentation il faudra recourir à une intervention. Lorsque cela est pratiqué par endoscopie, les effets secondaires et les éventuelles complications sont limités.

---

## Et en cas de refus du patient ?

Si la sonde mise par voie endoscopique ou chirurgicale n'est pas réalisée, cela peut avoir des conséquences néfastes car votre alimentation sera difficile voire même impossible.

---

## Informations administratives

Le jour de l'examen, n'empportez aucun objet de valeur et/ou d'argent. Munissez-vous de votre carte d'identité nationale, vos documents médicaux (résultats d'exams...), votre carte de groupe sanguin. Remettez au personnel infirmier le nom de votre médecin traitant ainsi que le nom et le numéro de téléphone d'une personne à contacter en cas de besoin.



---

# GASTROSTOMIE PERCUTANÉE ENDOSCOPIQUE

---

Service de **Gastroentérologie**



---

## Qu'est-ce qu'une gastrostomie percutanée endoscopique ?

C'est une intervention par voie endoscopique pendant laquelle le gastroentérologue place une sonde d'alimentation dans l'estomac au travers de la paroi abdominale lorsque le patient n'est plus capable de s'alimenter par lui-même. Via cette sonde directement dans l'estomac il pourra recevoir son apport énergétique nécessaire ainsi que certains médicaments.

---

## Comment se préparer à l'examen ?

A partir de la veille de l'examen à 22h vous ne devez plus boire ni manger.

Vous devrez arrêter tout traitement anticoagulant ou anti-agrégant plaquettaire sur recommandation de votre Gastroentérologue et/ou de votre Cardiologue. Vous devrez avoir un prélèvement sanguin pour vérifier la coagulation.

### Le jour de la pose :

- Vous devrez être à jeun strict (sans boire, ni manger, ni fumer).
- Vous devrez faire un bain de bouche avec une solution antiseptique.
- Si besoin, il sera fait un rasage de la paroi abdominale à la tondeuse.
- L'infirmière mettra en place une perfusion dans une veine du bras.
- Quelques minutes avant le geste, il vous sera injecté un antibiotique à titre préventif qui a pour but de diminuer le risque d'infection, à moins que vous ne soyez déjà sous traitement antibiotique pour une autre raison. Il est important de signaler tout antécédent de réaction allergique même mineure.

---

## Comment se déroule la gastrostomie percutanée endoscopique ?

Le gastroentérologue introduit l'endoscope dans votre estomac afin de faire un repérage sur la paroi abdominale par la luminosité de son appareil.

Deux techniques sont possibles : la technique « pull ». La sonde de gastrostomie après incision de la paroi abdominale est introduite par la bouche et tractée par un fil guide ; on la récupère ensuite au travers de l'orifice de gastrostomie. La Technique « push » utilise une sonde à ballonnet qui est placée directement dans l'estomac sous contrôle endoscopique.



Centre Hospitalier de Wallonie picarde - CHwapi  
Association Sans But Lucratif

---

### Site IMC

80, chaussée de Saint-Amand - 7500 Tournai

---

### Site NOTRE-DAME

9, avenue Delmée - 7500 Tournai

---

### Site UNION

51, rue des Sports - 7500 Tournai

---

### Centre de Consultations de PÉRUWELZ

11, rue de Sondeville - 7600 Péruwelz



Numéro d'appel général unique  
pour tous les sites : 069/333 111

www.chwapi.be |  