

Analyses Anapath : Résumé des modalités des prélèvements :

- **Demande d'analyse :**

- Patient : identifié avec une grande étiquette CHwapi ou vignette mutuelle = **données complètes du patient (nom, prénom, adresse, n° NISS, n° dossier => vérifier l'identité du patient selon les bonnes pratiques de l'identito-vigilance !**
- Renseignements cliniques :
 - Une liste précise et numérotée des différents échantillons.
 - Les données cliniques pertinentes : nature de l'échantillon, renseignements cliniques utiles à l'analyse et à l'interprétation des résultats.
 - **Date et heure du prélèvement + heure fixation** (=> si le prélèvement n'est pas placé immédiatement dans le milieu fixateur).
 - Indiquer si le prélèvement est **infectieux + noter le pathogène**.
 - Indiquer si le prélèvement est **urgent**.
- Médecin : **Date + cachet + signature**

- **Prélèvements :**

- Identification patient : identifié avec une petite étiquette CHwapi ou vignette mutuelle
Si plusieurs prélèvements : indiquer le numéro du prélèvement (écrit sans possibilité de confusion).

Analyses	Types de prélèvements	Milieu fixateur à utiliser	Conditions de stockage	
			Milieu seul	Avec Prélèvement
Cytologie NON gynécologique	Ponctions et liquides	Cytolyt (tube capuchon mauve ou pot capuchon bleu)	T° ambiante	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
	Ponctions et liquides	A frais Uniquement pour liquides et ponctions de grand volume (ascite, pleural, péricardique...)	Pot sec (propre) T° ambiante	Frigo (local dépôt)
	Lames	Etalement de ponction fixé à la laque sur lame	T° ambiante	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
Cytologie gynécologique + HPV	Frottis en milieu liquide	Pots PréservCyt®	T° ambiante	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
Histologie et immunohistochimie	Biopsies	Formol tamponné neutre 4% (pots avec capuchon rouge ou bleu)	T° ambiante	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
	Pièces opératoires	Formol tamponné neutre 4% (boîtes hermétiques)	T° ambiante	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
Immunofluorescence	Biopsie cutanée	Milieu de Michel	Frigo	Frigo puis T° ambiante uniquement pour le transport.
Examens extemporanés (ou seins avec microcalcifications)	Biopsies ou Pièces opératoires	Pas de milieu = A frais	Pas de stockage => transfert du prélèvement en anapath le + rapidement possible !	

Pour les **Autopsie adultes + fœtales/pédiatriques** : suivre les flux.

- Flux Autopsie adulte.
- Flux Autopsie fœtale-pédiatrique.

Nom Kalilab : Résumé prélèvements anapath

N° Kalilab : LAP_PREA_PRÉA_FI_001-05

Pour les **examens extemporanés et les échantillons urgents à frais** (sauf ponctions) => toujours téléphoner au secrétariat anapath (33.33.70)

UNION : Envoyer directement le prélèvement via le passe-plat.

ND : le secrétariat envoie une navette en urgence + placer le prélèvement dans le sac de couleur + colson y compris pour les extemporanés. ! Bien inscrire le n° de téléphone de la salle d'op.

Compléter les feuilles de traçabilité + placer les prélèvements dans un sac de couleur + fermé par un colson.

➤ Analyses urgentes et prélèvements à frais :

=> prévenir le laboratoire d'anapath le plus tôt possible. (33.33.70)

Types de prélèvements	Milieu à utiliser	Transport et sous-traitant	Conditions de stockage avec le prélèvement
Ganglion ou autres prélèvements dans le cadre d'une suspicion de Lymphome	Formol tamponné neutre 4% (pots)	Transport : Normal CHwapi Sous-traitant : si positif après analyse en anapath, envoi à l'IPG.	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
Biopsies muscles striés	un morceau 5-8 mm à frais enrobé dans une compresse imbibée de sérum physiologique.	Transport : URGENT => considéré comme une extempo Sous-traitant : envoi à l'anapath pour transfert direct à Brugman. (du lundi au jeudi avant midi. Pas le vendredi)	Contact téléphonique avec le secrétariat anapath la veille de l'intervention Pas de stockage => transfert du prélèvement en anapath le + rapidement possible !
Biopsies nerfs	1. un morceau 4mm dans glutaraldéhyde 4% 2. un morceau 10mm dans formol neutre 4% 3. un morceau 5-8 mm à frais enrobé dans une compresse imbibée de sérum physiologique.	Transport : URGENT => considéré comme une extempo Sous-traitant : envoi à l'anapath pour transfert direct à Brugman. (du lundi au jeudi avant midi. Pas le vendredi)	Contact téléphonique avec le secrétariat anapath la veille de l'intervention Pas de stockage => transfert du prélèvement en anapath le + rapidement possible !
Biopsie de tissu conjonctif, cutané dans le cadre de suspicion de Maladie Ehlers Danlos	1. Punch de 2 à 3 mm de diamètre (contenant le derme réticulaire) dans du formol neutre 4% 2. un morceau dans glutaraldéhyde 4%	Transport : URGENT => considéré comme un extempo. Sous-traitant : envoi à l'anapath pour transfert direct au CHULiège.	Contact téléphonique avec le secrétariat anapath la veille de l'intervention Pas de stockage => transfert du prélèvement en anapath le + rapidement possible !

➤ Analyses spéciales :

Types de prélèvements	Analyses	Milieu à utiliser	Transport et sous-traitant	Conditions de stockage avec le prélèvement
Biopsie	Biologie moléculaire (PCR)	Formol tamponné neutre 4% (pots)	Transport : Normal CHwapi	T° ambiante ou frigo (local dépôt)
Ponctions		A frais	Sous-traitant : Dépend de l'analyse demandée	Frigo (local dépôt)
Biopsie – pièce opératoire	FISH – SISH	Formol tamponné neutre 4% (pots)	Transport : Normal CHwapi ! Heures de fixation doivent être comprise entre 6H et 72H	T° ambiante ou frigo (local dépôt)