

## Quels sont les soins après le drainage ?

Une fois le drainage exécuté, il est important d'empêcher la fermeture de l'incision pour éviter une nouvelle accumulation de pus et donc une récurrence de l'abcès.

Selon la taille de la cavité qui sera présente après le drainage, le médecin insérera une mèche absorbante dans cette cavité.

Cette mèche devra être changée après 24 heures, selon la quantité de pus produit dans la plaie. Ce changement de mèche devra être fait par un infirmier, soit au dispensaire, soit à domicile. Il est essentiel de bien suivre les recommandations qui auront été fournies par le médecin.

Pour contrôler la douleur, il faut élever la partie atteinte (s'il s'agit d'un membre). La prise d'antidouleurs ou d'anti-inflammatoires est possible, selon l'avis du médecin.

Il est interdit d'immerger la plaie dans un bain.

Un saignement léger est possible, cependant, un saignement abondant nécessite de contacter votre médecin traitant ou de vous présenter aux urgences.

Parfois, le traitement local n'est pas suffisant. Recontactez votre médecin si une fièvre apparaît (>38.5°C). L'incision d'un abcès comporte un risque d'infection à surveiller.

Si vous n'avez pas reçu de rendez-vous pour revenir en consultation, mais que vous jugez que cela est nécessaire, vous pouvez revoir votre médecin traitant ou prendre rendez-vous au **dispensaire soins de plaies en téléphonant au 069/258 256**, sauf consignes spécifiques du médecin qui vous a pris en charge aux urgences.



Urgences adultes : **069/333 080**

Urgences pédiatriques : **069/333 090**

Dispensaire soins de plaie : **069/258 256**.

Sur rendez-vous.

Le dispensaire est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18h et le samedi, de 8h à 12h.

## CONSEILS ET SOINS APRÈS UN DRAINAGE D'ABCÈS

Service des **Urgences**



---

## Qu'est-ce qu'un abcès ?

L'abcès est un amas de cellules infectées dans n'importe quel tissu de l'organisme (peau, foie, poumons, ...).

Au niveau de la peau, il trouve souvent son origine dans l'obstruction d'une glande de la peau qui s'infecte ensuite. Lorsqu'un follicule pileux (un poil) se bloque et s'infecte, on appelle ce type d'infection une folliculite.

---

## Quelles sont les causes ?

L'abcès peut débuter par une simple petite infection locale, mais il peut aussi provenir d'un autre site en se propageant par le sang. Il y a alors formation et collection de pus. L'infection est souvent secondaire à une morsure ou à un corps étranger comme une écharde ou un petit morceau de métal. Il sera donc important, lors du traitement, de retirer tout corps étranger.

Certaines maladies, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, prédisposent à la formation d'abcès.

---

## Quels en sont les symptômes ?

Les symptômes principaux sont une tuméfaction (bosse enflée) accompagnée de douleur, de chaleur et d'un écoulement de pus si l'abcès se crève spontanément. Il peut y avoir présence de température. Selon la localisation, il peut être impossible de s'asseoir (exemple : abcès périanal ou de la glande de Bartholin).

---

## Comment poser le diagnostic ?

Dans la plupart des cas, les questions posées et l'examen clinique suffisent. Parfois, en raison de la profondeur de l'abcès ou de l'infection cutanée qui l'accompagne, un examen de type échographie ou scanner sera réalisé.

---

## Quel est le traitement ?

Le traitement consiste en l'évacuation du pus, d'où la nécessité quasi absolue de drainer l'abcès. En effet, les antibiotiques seuls ne parviendront habituellement pas à guérir l'abcès.

Le drainage sera fait soit par le médecin des urgences, soit par le chirurgien, selon son importance et sa taille. Parfois, l'évacuation sera réalisée en salle d'opération.

Selon l'étendue et la localisation de l'abcès, la procédure sera exécutée sous anesthésie locale, sous sédation ou sous anesthésie générale.

Aux urgences, on utilise souvent une anesthésie par le froid et parfois une sédation par la respiration d'un gaz qui diminue la douleur et donne un état de sédation pendant les courtes minutes nécessaires au geste.



Centre Hospitalier de Wallonie picarde - CHwapi  
Association Sans But Lucratif

---

### Site IMC

80, chaussée de Saint-Amand - 7500 Tournai

---

### Site NOTRE-DAME

9, avenue Delmée - 7500 Tournai

---

### Site UNION

51, rue des Sports - 7500 Tournai

---

### Centre de Consultations de PÉRUWELZ

11, rue de Sondeville - 7600 Péruwelz



Numéro d'appel général unique  
pour tous les sites : 069/333 111

www.chwapi.be |  