

EFFETS INDÉSIRABLES

- Amoxicilline-acide clavulanique cause fréquemment des effets indésirables digestifs tels que des nausées, diarrhées, vomissements, crampes. Contactez votre médecin en cas d'effets graves ou persistants (ex : apparition de fièvre, selles liquides plus de 3 fois par jour, diarrhées persistantes, crampes abdominales sévères).
- Certains effets indésirables rares, mais graves, peuvent également survenir. **Contactez immédiatement un médecin si ces symptômes se présentent :**
 - ◇ **Réaction allergique :** gonflement rapide de la peau ou des lèvres, sensation d'oppression ou difficultés à respirer, démangeaisons, éruptions cutanées.
 - ◇ Réactions au niveau de la peau (rougeurs, boutons, cloques, plaques, démangeaisons).
 - ◇ Convulsions (en particulier en cas de surdosage).
 - ◇ Saignements ou apparition anormale de bleus.
 - ◇ Fièvre, frissons, douleurs articulaires ou gonflement des ganglions (ex: au niveau des aisselles).
 - ◇ Coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux éventuellement accompagnée de nausées ou de vomissements.
 - ◇ Inflammation ou démangeaisons de la bouche ou de la zone génitale.

CONSERVATION

- Les comprimés se conservent dans leur emballage d'origine à température ambiante (15 °C-25 °C) et à l'abri de l'humidité. Tenez-les hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux.
- S'il vous reste des antibiotiques, ramenez-les chez votre pharmacien. Ne les utilisez pas pour d'autres personnes ou d'autres situations sans avis médical.

La présente fiche a été élaborée par des pharmaciens hospitaliers, en collaboration avec des médecins infectiologues. Elle est **informative et ne se substitue pas à la notice du médicament** et aux informations transmises par votre médecin et/ou votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions concernant votre traitement, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou pharmacien.

Lien utile: www.pharmainfo.be

Inscrivez le nom de votre médicament dans la barre de recherche. Vous pourrez notamment retrouver sa notice.



INFORMATIONS AUX PATIENTS ADULTES

AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE Comprimé 875/125 mg et 500/125 mg

Ex : Amoclane®, Augmentin®, Amoxiclav®,...

Amoxicilline-acide clavulanique est un antibiotique de la famille des pénicillines. Il est utilisé pour combattre un grand nombre d'infections causées par différents types de bactéries (spectre large).

Patient (Nom – Prénom):

Cachet du médecin ayant initié le traitement :

Indication :

Posologie :

Date de début du traitement :

Date de fin du traitement :

MODE D'EMPLOI

- Amoxicilline-acide clavulanique se prend généralement **deux ou trois fois par jour**. Prenez les comprimés à peu près aux mêmes heures chaque jour, en répartissant les prises de manière régulière sur 24 heures.
- Avez les comprimés avec un grand verre d'eau **pendant le repas**. La prise avec le repas n'est pas obligatoire mais peut atténuer les troubles gastriques.
- Une adaptation de la dose peut être nécessaire si vous avez des problèmes de reins ou une infection sévère.
- Suivez toujours la prescription de votre médecin ou les recommandations de votre pharmacien.
- En cas de **dose oubliée**, prenez-la dès que possible, sauf s'il reste moins de 4 heures jusqu'à la prochaine dose prévue. Prenez la dose suivante à l'heure prévue. Ne prenez pas de double dose.

DURÉE DU TRAITEMENT

- Votre médecin définit la durée de votre traitement.
- N'arrêtez pas le traitement avant la fin. Même si vous vous sentez mieux, des bactéries peuvent encore être présentes.
- Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.
- La prise adéquate de l'antibiotique limite l'apparition de bactéries résistantes.

INTERACTIONS

- Informez toujours votre médecin et votre pharmacien de la liste complète et actualisée des médicaments et compléments alimentaires que vous prenez mais également de tout ajout de nouveau traitement. Ils pourront ainsi **vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité grave** avec l'antibiotique.

PRÉCAUTIONS

- **Avant** de prendre ce traitement, **informez votre médecin** et demandez-lui conseil **si** :
 - ◇ Vous présentez une allergie (ou un effet secondaire connu) à ce type d'antibiotique (famille des pénicillines).
 - ◇ Vous avez des problèmes de la fonction du foie (insuffisance hépatique) ou des reins (insuffisance rénale).
 - ◇ Vous souffrez d'une **mononucléose** infectieuse active.
 - ◇ Vous êtes **enceinte** ou vous **allaitez**.
 - ◇ Vous prenez d'autres médicaments.
- Votre médecin pourrait vous prescrire une prise de sang de contrôle en cas de traitement prolongé.