

## EFFETS INDÉSIRABLES

- Céfadroxil peut causer des effets indésirables chez certaines personnes, tels que des nausées, diarrhées, vomissements, douleurs abdominales. Contactez votre médecin en cas d'effets graves ou persistants (ex: apparition de fièvre, selles liquides plus de 3 fois par jour, diarrhée persistante, crampes abdominales sévères).
- Certains effets indésirables rares, mais graves, peuvent également survenir. **Contactez immédiatement un médecin si ces symptômes se présentent:**
  - ◇ **Réaction allergique** : gonflement rapide de la peau ou des lèvres, sensation d'oppression ou difficultés à respirer, démangeaisons, éruptions cutanées.
  - ◇ Saignements ou apparition anormale de bleus.
  - ◇ Réactions au niveau de la peau (plaques rouges, peau qui pèle, cloques).
  - ◇ Fièvre, douleurs articulaires, gonflement des ganglions ou malaise général.
  - ◇ Inflammation ou démangeaisons de la bouche ou de la zone génitale.
  - ◇ Coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux éventuellement accompagnée de nausées ou vomissements.
  - ◇ Crises d'épilepsie.

## CONSERVATION

- Les gélules se conservent dans leur emballage d'origine à température ambiante (15 °C-25 °C) et à l'abri de l'humidité. Tenez-les hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux.
- S'il vous reste des antibiotiques, ramenez-les chez votre pharmacien. Ne les utilisez pas pour d'autres personnes ou d'autres situations sans avis médical.

La présente fiche a été élaborée par des pharmaciens hospitaliers, en collaboration avec des médecins infectiologues. Elle est **informative et ne se substitue pas à la notice du médicament** et aux informations transmises par votre médecin et/ou votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions concernant votre traitement, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou pharmacien.

Lien utile : [www.pharmainfo.be](http://www.pharmainfo.be)

Inscrivez le nom de votre médicament dans la barre de recherche. Vous pourrez notamment retrouver sa notice.



## INFORMATIONS AUX PATIENTS ADULTES

### CEFADROXIL Gélule 500 mg

Ex : Cefadroxil Sandoz ®,...

Céfadroxil est un antibiotique de la famille des céphalosporines. Il possède des similitudes avec la famille des pénicillines. Il est utilisé pour combattre les infections causées par différents types de bactéries.

Patient (Nom – Prénom):

Cachet du médecin ayant initié le traitement :

Indication : .....

Posologie : .....

Date de début du traitement : .....

Date de fin du traitement : .....

## MODE D'EMPLOI

- Céfadroxil se prend généralement **deux, trois ou quatre fois par jour**. Prenez les gélules à peu près aux mêmes heures chaque jour, en répartissant les prises de manière régulière sur 24 heures.
- Avez les gélules avec un grand verre d'eau, **pendant ou en dehors des repas**. La prise avec le repas peut atténuer les troubles gastriques.
- Une adaptation de la dose peut être nécessaire si vous avez des problèmes de reins ou une infection sévère. Suivez toujours la prescription de votre médecin ou les recommandations de votre pharmacien.
- En cas de **dose oubliée**, prenez-la dès que possible, sauf s'il reste moins de 4 heures jusqu'à la prochaine dose prévue. Prenez la dose suivante à l'heure prévue. Ne prenez pas de double dose.

## DURÉE DU TRAITEMENT

- Votre médecin définit la durée de votre traitement.
- N'arrêtez pas le traitement avant la fin. Même si vous vous sentez mieux, des bactéries peuvent encore être présentes.
- Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.
- La prise adéquate de l'antibiotique limite l'apparition de bactéries résistantes.

## PRÉCAUTIONS

- **Avant** de prendre ce traitement, **informez votre médecin** et demandez-lui conseil **si** :
  - ◇ Vous présentez une allergie (ou un effet secondaire connu) à ce type d'antibiotique (famille des céphalosporines ou des pénicillines).
  - ◇ Vous avez des problèmes de la fonction des reins (insuffisance rénale).
  - ◇ Vous êtes **enceinte** ou vous **allaitez**.
  - ◇ Vous prenez d'autres médicaments.
- Votre médecin pourrait vous prescrire une prise de sang de contrôle en cas de traitement prolongé.

## INTERACTIONS

- Informez toujours votre médecin et votre pharmacien de la liste complète et actualisée des médicaments et compléments alimentaires que vous prenez mais également de tout ajout de nouveau traitement. Ils pourront ainsi **vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité grave** avec l'antibiotique.

