

EFFETS INDÉSIRABLES

- Ciprofloxacine peut causer des effets indésirables chez certaines personnes, tels que des nausées, vomissements, diarrhées et maux de tête. Contactez votre médecin en cas d'effets graves ou persistants.
- Certains effets indésirables rares, mais graves, peuvent également survenir. **Contactez immédiatement un médecin si ces symptômes se présentent :**
 - ◇ Douleurs ou gonflement dans les **tendons**, muscles ou articulations ou difficultés à marcher.
 - ◇ **Réaction allergique :** gonflement rapide de la peau ou des lèvres, sensation d'oppression ou difficultés à respirer, démangeaisons, éruptions cutanées.
 - ◇ Sensations anormales telles que fourmillements, picotements, chatouillements, engourdissement ou sensation de brûlure.
 - ◇ Essoufflement soudain, palpitations ou rythme cardiaque irrégulier, douleur intense dans l'abdomen, la poitrine ou le dos.
 - ◇ Réactions au niveau de la peau (plaques rouges, peau qui pèle, cloques).
 - ◇ Troubles de la vue, du goût, de l'odorat et de l'audition
 - ◇ Pensées dépressives, anxiété, confusion, agitation, hallucinations, troubles du sommeil et de la mémoire.
 - ◇ Vertiges, évanouissement ou convulsions.
 - ◇ Coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux éventuellement accompagnée de nausées ou vomissements.
 - ◇ Saignements ou apparition anormale de bleus.
 - ◇ Inflammation ou démangeaisons de la bouche ou de la zone génitale

CONSERVATION

- Les comprimés se conservent dans leur emballage d'origine à température ambiante (15 °C-25 °C) et à l'abri de l'humidité. Tenez-les hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux.
- S'il vous reste des antibiotiques, ramenez-les chez votre pharmacien. Ne les utilisez pas pour d'autres personnes ou d'autres situations sans avis médical.

La présente fiche a été élaborée par des pharmaciens hospitaliers, en collaboration avec des médecins infectiologues. Elle est **informative et ne se substitue pas à la notice du médicament** et aux informations transmises par votre médecin et/ou votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions concernant votre traitement, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou pharmacien.

Lien utile : www.pharmainfo.be

Inscrivez le nom de votre médicament dans la barre de recherche. Vous pourrez notamment retrouver sa notice.



INFORMATIONS AUX PATIENTS ADULTES

CIPROFLOXACINE Comprimé 500 et 750 mg

Ex: Ciproxine®, ...

Ciprofloxacine est un antibiotique de la famille des fluoroquinolones. Il est utilisé pour combattre les infections causées par différents types de bactéries.

Patient (Nom – Prénom):

.....

Cachet du médecin ayant initié le traitement :

Indication :

Posologie :

Tiers-payant applicable : oui - non

Date de début du traitement :

Date de fin du traitement :

MODE D'EMPLOI

- Ciprofloxacine se prend généralement **deux fois par jour** (matin et soir). Prenez les comprimés à peu près aux mêmes heures chaque jour.
- Avalez les comprimés avec un grand verre d'eau, **pendant ou en dehors des repas**. La prise avec le repas peut atténuer les troubles gastriques.
- Une adaptation de la dose peut être nécessaire si vous avez des problèmes de reins ou une infection sévère.
- Suivez toujours la prescription de votre médecin ou les recommandations de votre pharmacien.
- Evitez la consommation des produits suivants pendant les 2 heures précédant et suivant la prise de l'antibiotique: **produits laitiers** (ex : lait, yaourt) et boissons enrichies en **minéraux** (calcium, magnésium, fer,...).
- En cas de **dose oubliée**, prenez-la dès que possible, sauf s'il reste moins de 6 heures jusqu'à la prochaine dose prévue. Prenez la dose suivante à l'heure prévue. Ne prenez pas de double dose.

DURÉE DU TRAITEMENT

- Votre médecin définit la durée de votre traitement.
- N'arrêtez pas le traitement avant la fin. Même si vous vous sentez mieux, des bactéries peuvent encore être présentes.
- Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.
- La prise adéquate de l'antibiotique limite l'apparition de bactéries résistantes.

PRÉCAUTIONS

- **Avant** de prendre ce traitement, **informez votre médecin** et demandez-lui conseil **si** :
 - ◇ Vous présentez une allergie (ou un effet secondaire connu) à ce type d'antibiotique (famille des fluoroquinolones).
 - ◇ Vous avez déjà eu ou vous êtes à risque de problèmes de **tendons** ou d'articulations (ex : polyarthrite rhumatoïde, greffe de certains organes, traitement par cortisone) ou si vous pratiquez une activité sportive à risque.
 - ◇ Vous souffrez d'une maladie cardiaque ou de **trouble du rythme cardiaque**.
 - ◇ Vous avez des problèmes de la fonction des reins (insuffisance rénale).
 - ◇ Vous souffrez d'**épilepsie** ou d'une autre affection neurologique ou cérébrale.
 - ◇ Vous souffrez d'un **anévrisme** ou d'une maladie à risque de formation d'anévrisme.
 - ◇ Vous êtes originaire du bassin méditerranéen ou d'Afrique ou si vous êtes connu porteur d'un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (favisme).
 - ◇ Vous souffrez d'une myasthénie.
 - ◇ Vous êtes **enceinte** ou vous **allaitez**.
 - ◇ Vous prenez d'autres médicaments.
- Votre médecin pourrait vous prescrire une prise de sang de contrôle en cas de traitement prolongé.
- Dans de rares cas, une hypersensibilité aux **rayons U.V. et au soleil** peut apparaître. Evitez le soleil et les cabines de bronzage, portez des vêtements protecteurs et appliquez une crème solaire.

INTERACTIONS

- Informez toujours votre médecin et votre pharmacien de la liste complète et actualisée des médicaments et compléments alimentaires que vous prenez mais également de tout ajout de nouveau traitement. Ils pourront ainsi **vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité grave** avec l'antibiotique.
- L'efficacité du traitement diminue en cas de prise simultanée avec certains médicaments (ex : antiacides) ou compléments alimentaires qui contiennent du calcium, magnésium, fer, aluminium ou zinc. Prenez votre antibiotique 2 heures avant ou au moins 4 heures après ces médicaments. **Demandez conseil à votre pharmacien.**