

## EFFETS INDÉSIRABLES

- Clindamycine peut causer des effets indésirables chez certaines personnes, tels que des nausées, vomissements, diarrhées et une mycose. Contactez votre médecin en cas d'effets graves ou persistants.
- Certains effets indésirables rares, mais graves, peuvent également survenir. **Contactez immédiatement un médecin si ces symptômes se présentent :**
  - ◊ Éruptions cutanées en taches apparaissant en cours de traitement.
  - ◊ Diminution du débit urinaire, gonflement des jambes, des chevilles ou des pieds, un essoufflement ou des nausées.
- Le traitement par Clindamycine modifie la flore normale du côlon, ce qui peut favoriser l'apparition d'une **colite** liée aux antibiotiques. Cette forme de colite peut évoluer vers une diarrhée sévère, de la fièvre, d'importantes crampes abdominales qui peuvent être accompagnées d'une perte de sang et de glaires. Contactez immédiatement votre médecin si certains de ces symptômes se présentent. Une colite liée aux antibiotiques peut se produire jusqu'à 2 à 3 semaines après l'arrêt du traitement par Clindamycine.

## CONSERVATION

- Les gélules se conservent dans leur emballage d'origine à température ambiante (15 °C-25 °C) et à l'abri de l'humidité. Tenez-les hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux.
- S'il vous reste des antibiotiques, ramenez-les chez votre pharmacien. Ne les utilisez pas pour d'autres personnes ou d'autres situations sans avis médical.

La présente fiche a été élaborée par des pharmaciens hospitaliers, en collaboration avec des médecins infectiologues. Elle est **informative et ne se substitue pas à la notice du médicament** et aux informations transmises par votre médecin et/ou votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions concernant votre traitement, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou pharmacien.

Lien utile : [www.pharmainfo.be](http://www.pharmainfo.be)

Inscrivez le nom de votre médicament dans la barre de recherche. Vous pourrez notamment retrouver sa notice.



## INFORMATIONS AUX PATIENTS ADULTES

### CLINDAMYCINE Gélule 150 et 300 mg

Ex : Dalacin C®,...

Clindamycine est un antibiotique de la famille des lincosamides. Il est utilisé pour combattre les infections causées par différents types de bactéries.

Patient (Nom – Prénom):

Cachet du médecin ayant initié le traitement :

Indication : .....

Posologie : .....

Date de début du traitement : .....

Date de fin du traitement : .....

## MODE D'EMPLOI

- Clindamycine se prend généralement **trois à quatre fois par jour**. Prenez les gélules à peu près aux mêmes heures chaque jour, en répartissant les prises de manière régulière au cours de la journée.
- Avalez les gélules avec un grand verre d'eau **pendant ou en dehors des repas**.
- Suivez toujours la prescription de votre médecin ou les recommandations de votre pharmacien.
- En cas de **dose oubliée**, prenez la dose suivante à l'heure prévue. Ne prenez pas de double dose.

## DURÉE DU TRAITEMENT

- Votre médecin définit la durée de votre traitement.
- N'arrêtez pas le traitement avant la fin. Même si vous sentez mieux, des bactéries peuvent encore être présentes.
- Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.
- La prise adéquate de l'antibiotique limite l'apparition de bactéries résistantes.

## PRÉCAUTIONS

- **Avant** de prendre ce traitement, **informez votre médecin** et demandez-lui conseil **si** :
  - ◇ Vous présentez une allergie (ou un effet secondaire connu) à ce type d'antibiotique (famille des lincosamides).
  - ◇ Vous avez des problèmes de la fonction du foie (insuffisance hépatique) ou des reins (insuffisance rénale).
  - ◇ Vous êtes **enceinte** ou vous **allaitez**.
  - ◇ Vous prenez d'autres médicaments.
- Votre médecin pourrait vous prescrire une prise de sang de contrôle en cas de traitement prolongé.

## INTERACTIONS

- Informez toujours votre médecin et votre pharmacien de la liste complète et actualisée des médicaments et compléments alimentaires que vous prenez mais également de tout ajout de nouveau traitement. Ils pourront ainsi **vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité grave** avec l'antibiotique.

