EFFETS INDÉSIRABLES

- Co-trimoxazole peut causer des effets indésirables digestifs tels que des nausées, vomissements et diarrhées. Contactez votre médecin en cas d'effets graves ou persistants (ex : apparition de fièvre, selles liquides plus de 3 fois par jour, crampes abdominales sévères).
- **Contactez immédiatement un médecin si les symptômes suivants se présentent :**
  - ◊ Réactions au niveau de la peau (rougeurs, sensation de brûlure, boutons, cloques, plaques, démangeaisons). Un risque de réaction cutanée grave existe.
  - ◊ Fièvre, gonflement des ganglions, symptômes de type grippal.
  - ◊ Coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux, éventuellement accompagnée de nausées ou vomissements. Un risque de toxicité sur le foie existe.
- Des troubles de la formule sanguine et/ou des troubles des taux de potassium et de sodium dans le sang peuvent apparaitre suite à la prise de Co-trimoxazole. Dans certains cas de prise de ce médicament au long cours, votre médecin pourrait vous prescrire un complément en vitamine B9 et/ou prescrira une prise de sang de contrôle.
- Des hypoglycémies peuvent survenir.

EpiCURA - CHMouscron - CHR Haute Senne - CHwapi

CONSERVATION

- Les comprimés se conservent dans leur emballage d'origine à température ambiante (15 °C-25 °C) et à l'abri de l'humidité. Tenez-les hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux.
- S'il vous reste des antibiotiques, ramenez-les chez votre pharmacien. Ne les utilisez pas pour d'autres personnes ou d'autres situations sans avis médical.

La présente fiche a été élaborée par des pharmaciens hospitaliers, en collaboration avec des médecins infectiologues. Elle est **informative et ne se substitue pas à la notice du médicament** et aux informations transmises par votre médecin et/ou votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions concernant votre traitement, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou pharmacien.

Lien utile: www.pharmainfo.be

Inscrivez le nom de votre médicament dans la barre de recherche. Vous pourrez notamment retrouver sa notice.

INFORMATIONS AUX PATIENTS ADULTES

CO-TRIMOXAZOLE = SULFAMÉTHOXAZOLE-TRIMÉTHOPRIME Comprimé 800/160 mg

Ex : Bactrim®, Eusaprim®,...

Co-trimoxazole est une association de Sulfaméthoxazole et de Triméthoprime. Co-trimoxazole est un antibiotique de la famille des sulfamidés. Il est utilisé pour combattre les infections causées par différents types de bactéries.

Patient (Nom – Prénom):

.....

Cachet du médecin ayant initié le traitement :

Indication : .....

Posologie : .....

Date de début du traitement : .....

Date de fin du traitement : .....

RÉSEAU PHARE
Une palette de compétences au service de votre santé

Hospital Outbreak Support Teams
PHARE

MODE D'EMPLOI

- Co-trimoxazole se prend généralement **deux fois par jour** (matin et soir). Prenez les comprimés à peu près aux mêmes heures chaque jour.
- Avalez les comprimés avec un grand verre d'eau, de préférence **après les repas.**
- Une adaptation de la dose peut être nécessaire si vous avez des problèmes de reins ou une infection sévère.
- Suivez toujours la prescription de votre médecin ou les recommandations de votre pharmacien.
- En cas de **dose oubliée,** prenez-la dès que possible, sauf s'il reste moins de 6 heures jusqu'à la prochaine dose prévue. Prenez la dose suivante à l'heure prévue. Ne prenez pas de double dose.

DURÉE DU TRAITEMENT

- Votre médecin définit la durée de votre traitement.
- N'arrêtez pas le traitement avant la fin. Même si vous vous sentez mieux, des bactéries peuvent encore être présentes.
- Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.
- La prise adéquate de l'antibiotique limite l'apparition de bactéries résistantes.

PRÉCAUTIONS

- **Avant** de prendre ce traitement, **informez votre médecin** et demandez-lui conseil **si** :
  - ◊ Vous présentez une allergie (ou un effet secondaire connu) à ce type d'antibiotique (famille des sulfamidés).
  - ◊ Vous avez des problèmes de la fonction du foie (insuffisance hépatique) ou des reins (insuffisance rénale).
  - ◊ Vous présentez une carence en acide folique (vitamine B9).
  - ◊ Vous êtes originaire du bassin méditerranéen ou d'Afrique ou si vous êtes connu porteur d'un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (favisme).
  - ◊ Vous êtes **enceinte** ou vous **allaitez.**
  - ◊ Vous prenez d'autres médicaments.

- Votre médecin prescrira souvent une prise de sang de contrôle en cas de traitement prolongé.

- Dans de rares cas, une hypersensibilité aux **rayons U.V. et au soleil** peut apparaître. Evitez le soleil et les cabines de bronzage, portez des vêtements protecteurs et appliquez une crème solaire.

INTERACTIONS

- Informez toujours votre médecin et votre pharmacien de la liste complète et actualisée des médicaments et compléments alimentaires que vous prenez mais également de tout ajout de nouveau traitement. Ils pourront ainsi **vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité grave** avec l'antibiotique.
- Lors d'un traitement par Co-trimoxazole, la prise de substituts de sel pauvres en sodium et contenant du potassium peut favoriser une augmentation du potassium (hyperkaliémie). Ces substituts sont à éviter. **Demandez conseil à votre pharmacien.**