

EFFETS INDÉSIRABLES

- Minocycline peut causer des effets indésirables chez certaines personnes, tels que des nausées, vomissements et diarrhées. Contactez votre médecin en cas d'effets graves ou persistants.
- **Contactez immédiatement un médecin si les symptômes suivants se présentent :**
 - ◇ Réactions au niveau de la peau (rougeurs, sensation de brûlure, boutons, cloques, plaques, démangeaisons). Un risque de réaction cutanée grave existe.
 - ◇ Inflammation ou démangeaisons de la bouche ou de la zone génitale.
 - ◇ Fièvre, gonflement des ganglions, symptômes de type grippal.
 - ◇ Coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux, éventuellement accompagnée de nausées ou vomissements. Un risque de toxicité sur le foie existe.
 - ◇ Maux de tête et troubles de la vision.
- Minocycline peut provoquer un ralentissement réversible de la croissance osseuse, une coloration jaune des dents et un risque accru de caries (attention en cas de **grossesse**).
- Des effets indésirables œsophagiens (œsophagite et ulcérations) ont été rapportés. Veillez à prendre Minocycline avec un grand verre d'eau et attendez 30 minutes avant de vous allonger.
- Minocycline peut provoquer des vertiges disparaissant à l'arrêt du traitement.

CONSERVATION

- Les comprimés se conservent dans leur emballage d'origine à température ambiante (15 °C-25 °C) et à l'abri de l'humidité. Tenez-les hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux.
- S'il vous reste des antibiotiques, ramenez-les chez votre pharmacien. Ne les utilisez pas pour d'autres personnes ou d'autres situations sans avis médical.

La présente fiche a été élaborée par des pharmaciens hospitaliers, en collaboration avec des médecins infectiologues. Elle est **informative et ne se substitue pas à la notice du médicament** et aux informations transmises par votre médecin et/ou votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions concernant votre traitement, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou pharmacien.

Lien utile: www.pharmainfo.be

Inscrivez le nom de votre médicament dans la barre de recherche. Vous pourrez notamment retrouver sa notice.



INFORMATIONS AUX PATIENTS ADULTES

MINOCYCLINE

Comprimé 50 et 100 mg

Ex : Klinotab®, Mino-50®, Minotab®,...

Minocycline est un antibiotique de la famille des tétracyclines. Il est utilisé pour combattre les infections causées par différents types de bactéries.

Patient (Nom – Prénom):

Cachet du médecin ayant initié le traitement :

Indication :

Posologie :

Date de début du traitement :

Date de fin du traitement :

MODE D'EMPLOI

- Minocycline se prend généralement **une à deux fois par jour**. Prenez les comprimés à peu près aux mêmes heures chaque jour, en répartissant les prises de manière régulière au cours de la journée.
- Avez les comprimés avec un grand verre d'eau, **pendant ou en dehors des repas, en position debout ou assise**. Attendez au moins 30 minutes avant de vous allonger. La prise avec le repas peut atténuer les troubles gastriques.
- Suivez toujours la prescription de votre médecin ou les recommandations de votre pharmacien.
- En cas de **dose oubliée**, prenez-la dès que possible, sauf s'il reste moins de 6 heures jusqu'à la prochaine dose prévue. Prenez la dose suivante à l'heure prévue. Ne prenez pas de double dose.

DURÉE DU TRAITEMENT

- Votre médecin définit la durée de votre traitement.
- N'arrêtez pas le traitement avant la fin. Même si vous vous sentez mieux, des bactéries peuvent encore être présentes.
- Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.
- La prise adéquate de l'antibiotique limite l'apparition de bactéries résistantes.

PRÉCAUTIONS

- **Avant** de prendre ce traitement, **informez votre médecin** et demandez-lui conseil **si** :
 - ◇ Vous présentez une allergie (ou un effet secondaire connu) à ce type d'antibiotique (famille des tétracyclines).
 - ◇ Vous avez des problèmes de la fonction du foie (insuffisance hépatique) ou des reins (insuffisance rénale).
 - ◇ Vous êtes **enceinte** ou vous **allaitez**.
- Votre médecin pourrait vous prescrire une prise de sang de contrôle en cas de traitement prolongé.
- Dans de rares cas, une hypersensibilité aux **rayons U.V. et au soleil** peut apparaître. Évitez le soleil et les cabines de bronzage, portez des vêtements protecteurs et appliquez une crème solaire.

INTERACTIONS

- Informez toujours votre médecin et votre pharmacien de la liste complète et actualisée des médicaments et compléments alimentaires que vous prenez mais également de tout ajout de nouveau traitement. Ils pourront ainsi **vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité grave** avec l'antibiotique.
- Il est impératif d'éviter la prise simultanée d'Isotrétinoïne (Roaccutane®) ou de dérivés de l'ergot (antimigraineux) avec la Minocycline. **Demandez conseil à votre pharmacien.**
- Informez votre médecin si vous prenez des médicaments agissant sur la coagulation du sang (anticoagulants) car une réduction de la posologie de ceux-ci est parfois nécessaire.
- L'efficacité du traitement diminue en cas de prise simultanée avec certains médicaments (ex : antiacides) ou compléments alimentaires qui contiennent du calcium, magnésium, fer, aluminium ou zinc. Respectez un intervalle d'au moins 2 heures entre la prise de votre antibiotique et de ces médicaments.
- Attention, en cas de prise de contraceptifs hormonaux, l'effet n'est pas garanti et il est conseillé d'**utiliser une autre méthode contraceptive** (ex : préservatifs).