

EFFETS INDÉSIRABLES

- Rifampicine peut causer des effets indésirables chez certaines personnes, tels que des maux de tête, vertiges, nausées, vomissements ou diarrhées. Contactez votre médecin en cas d'effets graves ou persistants.
- Certains effets indésirables rares, mais graves, peuvent également survenir. **Contactez immédiatement un médecin si ces symptômes se présentent :**
 - ◇ Fièvre, fatigue et symptômes de type grippal.
 - ◇ Réactions au niveau de la peau (rougeurs, boutons, cloques, plaques, démangeaisons).
 - ◇ Inflammation ou démangeaisons de la bouche ou de la zone génitale.
 - ◇ Saignements ou apparition anormale de bleus.
 - ◇ Essoufflement et/ou toux sèche.
 - ◇ Coloration jaune de la peau et du blanc des yeux éventuellement accompagnée de nausées ou vomissements.
- Rifampicine peut entraîner une coloration orange-rouge de l'urine, de la salive, de la sueur ou des larmes. Cet effet est sans danger et disparaît avec l'arrêt du traitement. Attention, les lentilles de contact peuvent être colorées de manière permanente.

CONSERVATION

- Les gélules se conservent dans leur emballage d'origine à température ambiante (15 °C-25 °C) et à l'abri de l'humidité. Tenez-les hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux.
- S'il vous reste des antibiotiques, ramenez-les chez votre pharmacien. Ne les utilisez pas pour d'autres personnes ou d'autres situations sans avis médical.

La présente fiche a été élaborée par des pharmaciens hospitaliers, en collaboration avec des médecins infectiologues. Elle est **informatrice et ne se substitue pas à la notice du médicament** et aux informations transmises par votre médecin et/ou votre pharmacien.

Si vous avez d'autres questions concernant votre traitement, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou pharmacien.

Lien utile: www.pharmainfo.be

Inscrivez le nom de votre médicament dans la barre de recherche. Vous pourrez notamment retrouver sa notice.



INFORMATIONS AUX PATIENTS ADULTES

RIFAMPICINE Gélule 150 mg et 300 mg

Ex : Rifadine®,...

Rifampicine est un antibiotique de la famille des rifamycines. Il est utilisé pour combattre les infections causées par différents types de bactéries et dans le traitement de la tuberculose.

Patient (Nom – Prénom):

Cachet du médecin ayant initié le traitement :

Indication :

Posologie :

Date de début du traitement :

Date de fin du traitement :

MODE D'EMPLOI

- Rifampicine se prend **une fois, deux fois ou trois fois par jour** selon l'indication. Prenez les gélules à peu près aux mêmes heures chaque jour.
- Avalez les gélules avec un grand verre d'eau sur un estomac vide (**à jeun**), c'est-à-dire minimum **30 minutes avant** un repas ou **2 heures après** un repas.
- La dose administrée peut être adaptée à votre poids.
- Rifampicine est la plupart du temps prescrite en combinaison avec au moins un autre antibiotique.
- Suivez toujours la prescription de votre médecin ou les recommandations de votre pharmacien.

En cas de **dose oubliée** :

- Si vous prenez Rifampicine **une fois** par jour, prenez la dose oubliée dès que possible, sauf s'il reste moins de 12 heures jusqu'à la prochaine dose prévue.
- Si vous prenez Rifampicine **plusieurs fois** par jour, prenez la dose oubliée dès que possible sauf s'il reste moins de 4 heures jusqu'à la prochaine dose prévue.
- Prenez la dose suivante à l'heure prévue. Ne prenez pas de double dose.

DURÉE DU TRAITEMENT

- Votre médecin définit la durée de votre traitement.
- N'arrêtez pas le traitement avant la fin. Même si vous vous sentez mieux, des bactéries peuvent encore être présentes.
- Ne prolongez pas le traitement sans avis médical.
- La prise adéquate de l'antibiotique limite l'apparition de bactéries résistantes.

PRÉCAUTIONS

- **Avant** de prendre ce traitement, **informez votre médecin** et demandez-lui conseil **si** :
 - ◇ Vous présentez une allergie (ou un effet secondaire connu) à ce type d'antibiotique.
 - ◇ Vous avez des problèmes de la fonction du foie (insuffisance hépatique).
 - ◇ Vous consommez fréquemment de l'alcool.
 - ◇ Vous souffrez d'une porphyrie (maladie qui affecte l'hémoglobine dans le sang).
 - ◇ Vous êtes **enceinte** ou vous **allaitez**.
 - ◇ Vous prenez d'autres médicaments.
- Le traitement nécessite une prise de sang de contrôle régulière (en général, une fois par semaine en début de traitement).

INTERACTIONS

- Informez toujours votre médecin et votre pharmacien de la liste complète et actualisée des médicaments et compléments alimentaires que vous prenez mais également de tout ajout de nouveau traitement. Ils pourront ainsi **vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité grave** avec l'antibiotique.
- Rifampicine interagit, parfois de façon majeure, avec de **nombreux** autres médicaments (ex: immunosuppresseurs, médicaments pour fluidifier le sang, médicaments pour le cœur ou pour l'épilepsie, antiacides, ...), pouvant entraîner une diminution ou une augmentation de leurs effets. Des effets indésirables graves peuvent en résulter.
- **L'influence** de Rifampicine **sur les autres médicaments** peut se poursuivre **jusqu'à 4 semaines** après l'arrêt du traitement.
- Attention, en cas de prise de contraceptifs hormonaux, l'effet n'est pas garanti et il est conseillé d'**utiliser une autre méthode contraceptive** (ex : préservatifs) pendant et jusqu'au moins 4 semaines après l'arrêt de Rifampicine.